

1	Otite moyenne	Ne pas traiter d'emblée par des antibiotiques une otite moyenne aiguë chez les enfants.
2	Reflux gastrique	Ne pas utiliser d'antiacides pour traiter les reflux gastriques chez le nourrisson.
3	Toux	Ne pas donner de médicament contre la toux aux enfants.
4	Grippe intestinale	Ne pas réhydrater par voie intraveineuse en cas de déshydratation légère à modérée de liquides sans échec préalable de réhydratation par voie orale.
5	Bronchiolite	Ne pas systématiquement utiliser des traitements similaires à la cortisone ou contre l'asthme chez les nourrissons souffrant de bronchiolite.
6	Entorse de cheville	Ne pas réaliser de radiographies chez les enfants et les adolescent-e-s présentant une entorse de cheville avec un faible risque de fracture significative.
7	Fatigue chronique et maladie de Lyme	Ne pas effectuer de sérologie Borrelia sans suspicion clinique de maladie de Lyme.
8	Convulsion fébrile	Ne pas proposer d'examens de routine pour les enfants ayant retrouvé leur état de conscience habituel après une convulsion fébrile simple.
9	Angine	Ne pas demander d'examens sanguins chez les enfants souffrant de pharyngite aiguë.
10	Bronchiolite	Ne pas réaliser de radiographies du thorax de façon routinière chez les enfants présentant une bronchiolite.

