

1	Otite media	Non trattare sistematicamente l'otite media acuta nei bambini con antibiotici.
2	Reflusso di contenuto gastrico	Non somministrare farmaci antiacido per il trattamento del reflusso di contenuto gastrico nei lattanti.
3	Tosse	Non somministrare ai bambini farmaci per la tosse.
4	Gastroenterite	Non effettuare in prima istanza una reidratazione endovena nei bambini con disidratazione da lieve a moderata, se non è stata tentata prima una somministrazione di liquidi per via orale.
5	Bronchiolite	Non somministrare sistematicamente farmaci cortisonici o per l'asma ai lattanti con bronchiolite virale.
6	Distorsione della caviglia	Non effettuare radiografie a bambini e adolescenti che presentano una distorsione della caviglia con un basso rischio clinico di frattura significativa.
7	Stanchezza cronica e malattia di Lyme	Non effettuare analisi sierologiche per la Borrelia senza il sospetto clinico di malattia di Lyme.
8	Convulsione febbrile	Non effettuare esami di routine nei bambini che hanno ripreso il loro abituale stato di coscienza dopo una convulsione febbrile semplice.
9	Angina	Non effettuare esami del sangue nei bambini con faringite acuta.
10	Bronchiolite	Non effettuare radiografie del torace di routine ai bambini che presentano una bronchiolite.

